

Infopjece

ØJENKLINIKKEN LYNGLEV

ØJENLÅG – OPERATION AF LØS HUD ØVRE ØJENLÅG

Baggrund for operationen

Med alderen mister huden gradvist sin elasticitet. Huden på øjenlågene bliver løs, og den kan hænge ned mod det øvre øjenlågs øjenvipper og ned foran pupillen og genere synet

Der kan også være kosmetiske gener i form af "poser" over øjnene

Den overskydende hud kan fjernes ved en operation

Hjertemagnyl og anden acetylsalicylsyre (Kodimagnyl o lign)

Hvis du tager mild blodfortyndende medicin Hjertemagnyl bør du holde pause op til operationen

Pausens længde aftales i samråd med egen læge og øjenlægen

Ved anden acetylsalicylsyre Kodimagnyl o lign bør pauseres 2 uger før operationen

Blodfortyndende medicin

Hvis du tager regulær blodfortyndende medicin (AK-behandling) henvises til specialafdeling

Før operationen

Om morgenen på operationsdagen bedes ansigtet vasket grundigt og undlad at tage makeup på

Derudover kræver operationen ingen særlige forberedelser

Selve operationen

Du er i lokalbedøvelse under operationen

Operationen starter med at din hud renses og operationssnittet optegnes med tusch. Ved hjælp af en fin kanyle lægges lokalbedøvelse i huden på øjenlågene. Bedøvelsen spænder og kan i kort tid gøre ondt. Herefter vil du ikke føle smerte.

Dit ansigt bliver sterilt afdækket. Det kan virke indelukket, men du er sikret fri vejtrækning. Under selve operationen vil du kunne mærke berøring af huden.

Såret syes sammen med en fin tråd.

Efter operationen

Efter operationen kan du tage hjem og efter behov anvende isposer på øjenlågene det første døgn.

Hjemme anbefaler vi, at du ikke dyrker sport, sex eller anstrenger dig fysisk.

Du bedes holde dit hoved hævet over hjertets niveau i 2-3 dage. Såfremt der opstår lidt blødning fra såret bedes du i siddende stilling holde en ren klud mod såret i ca. 10 minutter. Blødningen vil da ofte stoppe.

Trådene fjernes efter 6-7 dage.

Undlad at bruge makeup og kontaktlinser i 2 uger efter operationen.

Risici og komplikationer

Blødning

Let sivende blødning er almindelig det første døgn. Kraftig blødning er sjælden, men kan være alvorlig. Hvis blødningen er kraftig eller ikke stopper ved let tryk på såret, giver smerte, nedsat syn eller dobbeltsyn, bedes du øjeblikkeligt henvende dig. Udenfor vor åbningstid kontakt 1813 med henblik på vurdering af vagthavende øjenlæge på øjenafdelingen Glostrup.

Infektion

Infektion er sjælden, men vil kræve medicin og evt. ny operation.

Misfarvning af huden

I dagene efter operationen vil der i varierende grad være misfarvning og hævelse som ofte vil aftage i løbet af 1-2 uger.

Løs hud

Huden på øjenlåget er nødvendig for at beskytte øjet. Det er derfor vigtigt ikke at fjerne for meget hud under operationen. Du kan ikke forvente, at huden bliver helt stram og glat

Dårligt kosmetisk resultat

Der kan opstå asymmetri og folder omkring arret. Folderne vil oftest mindskes i løbet af nogle måneder

Ardannelse

Svarende til den kirurgiske snitlinje opstår der naturligvis et ar svarende til øvre øjenlågsfure. Undlad soleksponering og anvend solcreme og solbriller i 2 måneder efter operationen

Maj 2018