

Infopjece

ØJENKLINIKKEN LYNGLÆV

ØJENLÅG – OPERATION AF ØJENLÅG

Hvorfor operation

Forskellige sygelige tilstande i øjenlågene, fx indkapslede bygkorn, vorter, småsvulster og "kolesterolpletter", behandles med operation

Hjertemagnyl og anden acetylsalicylsyre (Kodimagnyl o lign)

Hvis du tager mild blodfortyndende medicin Hjertemagnyl bør du afhængig af operationstype holde pause op til operationen
Eventuel pause og længde aftales i samråd med egen læge og øjenlægen

Ved anden acetylsalicylsyre Kodimagnyl o lign bør pauseres 2 uger før operationen

Blodfortyndende medicin

Hvis du tager regulær blodfortyndende medicin (AK-behandling) bør du afhængig af operationstype holde pause op til operationen
Eventuel pause og længde aftales i samråd med egen læge og øjenlægen

Før operationen

Om morgenen på operationsdagen bedes ansigtet vasket grundigt og undlad at tage makeup på

Derudover kræver operationen ingen særlige forberedelser

Selve operationen

Du er i lokalbedøvelse under operationen

Operationen starter med at din hud renses og operationssnittet optegnes med tusch
Ved hjælp af en fin kanyle lægges lokalbedøvelse svarende til operationsstedet.
Bedøvelsen spænder og kan i kort tid gøre ondt. Herefter vil du ikke føle smerte

Dit ansigt bliver i nogle tilfælde sterilt afdækket. Det kan virke indelukket, men du er sikret fri vejrtrækning. Under selve operationen vil du kunne mærke berøring af huden

Ved behov syes såret sammen med en fin tråd

Efter operationen

Når du er kommet hjem igen, anbefaler vi at du holder dig lidt i ro de første 2-3 dage efter operationen

Du skal i disse dage forsøge at holde hovedet hævet over hjertets niveau. Hvis det begynder at bløde fra såret, kan du ofte stoppe blødningen ved at holde en ren klud på såret i ca. 10 minutter, mens du sidder ned

Eventuel tråd i såret fjernes efter 6-7 dage

Brug ikke makeup i 2 uger efter operationen

Ved blødning eller andre komplikationer

Blødning

Det er normalt, at det bløder lidt fra såret det første døgn. En større blødning omkring øjet er sjælden. Hvis blødningen er kraftig eller ikke stopper ved let tryk på såret, bedes du henvende dig. Udenfor vor åbningstid kontakt 1813 med henblik på vurdering af vagthavende øjenlæge på øjenafdelingen Glostrup

Infektion

Infektion i forbindelse med denne type øjenlåsoperation er sjælden

Misfarvning af huden

I dagene efter operationen vil øjenomgivelserne i varierende grad være misfarvede og hævede

Ardannelse

Svarende til det kirurgiske sår opstår der naturligvis et lille ar. Undlad soleksponering og anvend solcreme og solbriller i 2 måneder efter operationen

Maj 2018